

September 2020- Pt. 1

BE WISER Teen Impaired & Distracted Driving Program

DID YOU KNOW?

DUI is more than alcohol and illegal drugs.

In a 2014 survey, 22.5%, nearly 1 in 4, of drivers tested positive for a drug that could impair their driving ability. Remember that just like driving after drinking, driving while under the influence of drugs can get you arrested.




Impaired driving is generally associated with alcohol, prescription drug abuse, or illegal drug use. However, **many legally obtained and commonly used over-the-counter and prescription drugs can affect a user's ability to drive safely.**



Cold and allergy medicines, antidepressants, opioids, and sleep aids can cause side effects, including drowsiness, nausea, and blurred vision, **all of which can put motorists at risk.**

Read and follow all warning labels before driving, and note that warnings against "operating heavy machinery" include driving a vehicle.



Riverside University
HEALTH SYSTEM

Public Health
Click here to
check out our site!

Source: NHTSA

¡Un boletín bimensual con información y recursos para padres de conductores adolescentes o que pronto serán conductores!

Septiembre 2020- Pt. 1

Programa para adolescentes sobre impedimentos y
BE WISER distracciones al manejar

¿USED SABÍA?

DUI es más que alcohol y drogas ilegales.


En una encuesta de 2014, el 22.5%, casi 1 de cada 4, de los conductores dieron positivo por un medicamento que podría afectar su capacidad de conducir. Recuerde que al igual que conducir después de beber, conducir bajo la influencia de drogas puede hacer que lo arresten.



La conducción en problemas se asocia generalmente con el alcohol, el abuso de drogas recetadas o el uso ilegal de drogas. Sin embargo, **muchos medicamentos de venta libre y recetados que se obtienen legalmente y se usan comúnmente pueden afectar la capacidad del usuario para conducir de manera segura.**



Lea y siga todas las etiquetas de advertencia antes de conducir, y tenga en cuenta que las advertencias contra "operar maquinaria pesada" incluyen conducir un vehículo.



Los medicamentos para el resfriado y la alergia, los antidepresivos, los opioides y los somníferos pueden causar efectos secundarios, como somnolencia, náuseas y visión borrosa, **todo lo cual puede poner en riesgo a los automovilistas.**

Origen: NHTSA

¡Haga clic aquí para ver nuestro sitio!

Riverside University
HEALTH SYSTEM

Public Health